

CARTE DE MISE EN GARDE

ABACAVIR/LAMIVUDINE/ZIDOVUDINE MYLAN

FACE 1

IMPORTANT - CARTE DE MISE EN GARDE

ABACAVIR/LAMIVUDINE/ZIDOVUDINE MYLAN 300 MG/150 MG/300 MG, COMPRIME
PELLICULE

(SULFATE D' ABACAVIR/LAMIVUDINE/ZIDOVUDINE)

CONSERVEZ CETTE CARTE SUR VOUS EN PERMANENCE

Ce médicament contient de l'abacavir. Certains patients le prenant donc peuvent donc développer une réaction d'hypersensibilité (réaction allergique grave) qui peut menacer le pronostic vital en cas de poursuite du traitement.

CONTACTEZ IMMÉDIATEMENT VOTRE MÉDECIN qui vous indiquera si vous devez arrêter de prendre Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Mylan, si :

1) vous présentez une éruption cutanée

OU,

2) vous présentez des symptômes appartenant à au moins DEUX des catégories suivantes :

- fièvre,
- essoufflement, maux de gorge ou toux,
- nausées ou vomissements ou diarrhée ou douleurs abdominales,
- fatigue ou courbatures sévères ou sensation de malaise général.

Si vous avez arrêté le traitement par ce médicament, ou un autre médicament contenant de l'abacavir (exemples : abacavir/lamivudine/zidovudine, ou abacavir/lamivudine, ou abacavir) en raison de cette réaction, **VOUS NE DEVEZ JAMAIS REPRENDRE** Abacavir/Lamivudine/Zidovudine mylan, ni tout autre médicament contenant de l'abacavir car cela peut entraîner, dans les heures qui suivent, une chute de votre pression artérielle menaçant le pronostic vital, voire le décès.

Contactez immédiatement votre médecin si vous suspectez une réaction d'hypersensibilité à **Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Mylan**. Veuillez indiquer ci-dessous les coordonnées de votre médecin :

Docteur :.....

Tél. :.....

En cas d'absence de celui-ci, veuillez contacter immédiatement un autre médecin pour un avis médical (par exemple : service des urgences de l'hôpital le plus proche).

Pour toute information générale concernant ABACAVIR/LAMIVUDINE/ZIDOVUDINE MYLAN 300 mg/150 mg/300 mg, comprimé pelliculé, contactez : MYLAN SAS France au 0800 12 35 50 (service et appel gratuit).